

SO

# OXY<sup>®</sup>

## 10 LOTION 25 g

### + ANDER BESTANDELE

Sien ingeslote voubiljet.

Skud die houer goed voor gebruik.

### DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSINGS:

Skud die houer goed voor gebruik.

Wend aan die aangetaste deel een maal per dag.

Vryf goed in. Vermyn kontak met oë, lippe en mond.

Hou slegs vir 2 ure op die vel, voordat dit afgewas word met water. Herhaal vir 2 tot 4 dae.

Indien daar geen ongemak ondervind word nie, kan die velmiddel een maal per dag aangewend word en vir 4 ure aanbly voordat dit met water afgespoel word. Herhaal vir 4 dae.

Wend dan saans aan en laat oornag aanbly vir die volgende week. Wend daarna soggens en saans aan.

Berg by of benede 25 °C  
Slegs vir uitwendige gebruik.  
Hou buite bereik van kinders.

SO

# OXY<sup>®</sup>

## 10 LOTION 25 g

### + OTHER INGREDIENTS

See enclosed package insert.

Shake container well before use.

### DIRECTIONS:

Shake container well before use.

Apply to affected area once a day. Rub in well.

Avoid contact with eyes, lips and mouth.

Leave on your skin for only 2 hours before washing if off with water.

Continue for 2 to 4 days.

If no discomfort is experienced, apply the lotion once daily and leave on for 4 hours before washing off with water.

Continue for the next 4 days.

Then, apply at night and leave on overnight for the next week.

Then apply morning and night.

Store at or below 25 °C  
For external use only.  
Keep out of reach of children.

### + ELKE 100 g BEVAT:

Bensoïelperoksied 10,0 g

Preserveermiddels:

Propielhidroksibensoaat 0,05 % m/m

Metielhidroksibensoaat 0,15 % m/m

### + Waarskuwings:

Indien daar onsekerheid bestaan oor die sensitiwiteit vir die produk of indien die produk nie voorheen gebruik is nie, kan dit getoets word, deur 'n klein hoeveelheid aan die voorarm aan te wend. Indien daar binne 24 uur 'n erge rooiheid of irritasie ontwikkel moet die produk nie gebruik word nie. Wees versigtig met aanwending aan die nek aangesien die vel van hierdie area baie sensitief is vir medikasie.

### + EACH 100 g CONTAINS:

Benzoyl peroxide 10,0 g

Preservatives:

Propyl hydroxybenzoate 0,05 % m/m

Methyl hydroxybenzoate 0,15 % m/m

### + Warnings:

If you are unsure or have not used the product before, test the product by applying to a small area of the lower arm at least 24 hours before use. If there is a severe redness or irritation, do not use the product. Apply with caution to the neck as the skin of this area is very sensitive to medication.